

# Plan d'alimentation du veau de la naissance au sevrage

## Pour qui ?

- Toutes les génisses, de la naissance jusqu'au sevrage vers 10 semaines.

## Comment ?

- Plan d'alimentation lactée :

- Alimentation avec colostrum puis lait de transition pendant au moins 5 jours (cf. [Fiches colostrum](#)).
- Alimentation au lactoremplaceur pas avant 5 jours de vie.
- Concentration de poudre de lait : généralement 125 à 130g/L de buvée selon la poudre utilisée (cf. [Protocole préparation lactoremplaceur](#)) (suivre les recommandations du fabricant).
- Ne pas confondre la masse de poudre de lait par litre de buvée et la masse de poudre par litre d'eau (150g de poudre de lait dans 1L d'eau correspond à 125 à 130g par litre de buvée).
- 2 repas par jour idéalement.
- Diminution progressive 2 semaines avant sevrage (cf. [Programme gestion du sevrage](#))

### Exemple de plan d'alimentation au lactoremplaceur de la naissance au sevrage vers 8-10 semaines :

Ce programme 'intensif' requiert une immunité satisfaisante du veau (IgG) et une hygiène stricte du matériel de préparation et de distribution.

Semaine d'allaitement	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	J1 - 4	J5-7									
Nombre de repas	J1 : 4+2L de colostrum		2	2	2	2	2	2	2	1	-
Volume par repas	J2 à J4 : 2x3L lait de transition		3,5L	3,5L	4L	4L	4L	4L	2L	2L	-

- Eau :
  - Eau propre et potable.
  - Température entre 8 et 12°C.
  - À disposition dès la naissance.
  - Distribuer 10 min après la buvée de lait (pour que la gouttière œsophagienne se réouvre).
  - Essentielle !! Favorise la consommation de concentré et de fourrage, ainsi que le développement du rumen.
- Plan d'alimentation solide :
  - Concentré premier âge :
    - à volonté dès le 5ème jour.
    - renouvelé tous les 15 jours.
  - Fourrage :
    - à disposition à partir de la 3ème semaine.
    - pas de fourrage de qualité (pénaliserait la consommation de concentrés), préférer une paille pour stimuler la croissance des papilles.