

Programme Gestion du sevrage des génisses

Bon à savoir

- Sevrage = grand stress pour le veau, ne pas cumuler avec d'autres stress (donc pas d'autres interventions ou changement au moment du sevrage, comme la vaccination ou l'écornage).
- Si mal géré : pénalise la croissance après le sevrage + génisse plus sensible aux maladies.
- Sevrage précoce bien géré → meilleure production laitière.

Qui ? Quand ?

- Toutes les génisses.
- Le sevrage se fait entre 8 et 10 semaines de vie (si toutes les conditions sont réunies) mais la préparation du sevrage se fait bien plus tôt : suivi du poids et bonne gestion de l'alimentation dès la naissance.

Prête à être sevrée ?

Une génisse prête à être sevrée :

- pèse idéalement 100k. L'évaluation du poids peut être réalisée à l'aide d'un ruban,
- ET consomme au moins 2kg de concentré par jour,
- ET est en bonne santé.

Si ces objectifs ne sont pas remplis, le veau est maintenu sous alimentation lactée (avec les mêmes recommandations que lors de la dernière semaine, cf *Programme plan d'alimentation du veau*) jusqu'à ce qu'ils soient atteints.

Comment ?

- Il faut que les veaux aient accès à du concentré dès le plus jeune âge (cf Programme plan d'alimentation du veau).
- Organiser un sevrage progressif pour diminuer le stress : sur 15 jours
 - 2 semaines avant : baisser la quantité de lait pour favoriser la consommation de concentré et de fourrage : diviser par 2 la quantité de lait donnée (mais toujours en 2 repas par jour).
 - 1 semaine avant : baisser la fréquence des repas de lait : passage à 1 repas par jour (cf. Programme plan d'alimentation du veau).
- Ne pas faire d'autre changement (ne pas cumuler les stress) : pas de changement de lot ou de logement, conserver le même concentré au moins 7 jours.

Remarques :

- Les plans d'alimentation avec une seule buvée par jour (« Once a Day ») ne sont pas les plus adaptés pour optimiser la croissance des génisses.
- Un programme spécifique devra être appliqué au DAL.