

PROTOCOLE SOINS DU NOMBRIL

Conduite à tenir « gros nombril »

Vous observez un veau avec un nombril de taille augmentée :


1

Palper le cordon avec des mains propres



Cas n°1

Masse dépressible, non chaude, non douloureuse, qu'on peut rentrer dans l'abdomen
=> **HERNIE**



2

Réduire la hernie et palper l'anneau herniaire (trou dans la paroi musculaire abdominale)

3

Taille < 2 doigts : Attendre et surveiller l'évolution
Taille > 2 doigts : Appeler le vétérinaire

Cas n°2

Masse chaude, douloureuse, non réductible, parfois humide ou purulente, avec atteinte possible de l'état général
=> **OMPHALITE**



2

Traitement immédiat :
, fois par jour pendant jours

3

En cas d'**échec** (= absence d'amélioration au bout de 3 jours, ou rechute après traitement) :
appeler le vétérinaire



Critères d'alerte :

Si le veau **urine par le nombril**
=> **Appeler le vétérinaire** pour chirurgie

Dans le cas d'une **omphalite** : si une forte atteinte de l'**état général** est observée, ou si le veau présente une ou plusieurs **articulations** grosses, chaudes et douloureuses
=> **Appeler le vétérinaire**